

รูปล้องหวายลายขวันดำ – *Sinomicrurus maclellandi* (Reinhardt, 1844)

ลักษณะ ภูเขาตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูกัน 240 มิลลิเมตร และหางยาว 26 มิลลิเมตร – จาก Taylor, 1963) หัวสั้นและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอเล็กน้อย ตาเล็ก ลำตัวกลมและเรียวยาว หางสั้นและส่วนปลายของหางมน ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 13 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 207 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 33 เกล็ด (Taylor, 1963)

ลำตัวมีส่วนปลายทางด้านบนของหัวสีดำจาง ในตำแหน่งด้านท้ายตามีแถบกว้างสีขาวหรือสีครีมพาดขวาง และมีแถบสีดำพาดขวางที่ท้ายทอย บนหลังและทางด้านบนของหางสีน้ำตาลแดง มีเส้นสีดำ (ประมาณ 1 – 2 แผ่นเกล็ด) พาดขวางเป็นระยะตลอดความยาวลำตัวและหาง ด้านบนของหางมีจุดสีดำ 2 จุดอยู่ระหว่างเส้นสีดำ คางสีเหลืองและมีจุดประเป็นเส้นยาวสีดำในแนวกลาง ด้านท้องสีเหลืองและมีปื้นหรือจุดสีดำ

การแพร่กระจาย จีน เนปาล ภูิ่ปุ่น อินเดีย เมียนมาร์ เวียดนาม ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบในป่าดิบแล้ง

พื้นที่อาศัย ตามพื้นล่างของป่า

นิสัย ไม่มีข้อมูล

สถานภาพ สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สำหรับสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ เป็นสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคามตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) แต่ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบได้น้อยครั้ง